

 <p>Servizio Sanitario della Toscana S.C. Medicina Interna H Valle del Serchio</p>	<p>INFORMATIVA CVC PORTH-A-CATH</p>	<p>MR MGB 022 Rev. 0 del 03/08/2016 Pag. 1 di 1</p>
---	--	--

COS'E' IL PORTH

E' un presidio impiantabile che viene usato per infondere farmaci direttamente nel circolo. E' completamente sotto cute e una volta impiantato sarà visibile solo una piccola area sotto la pelle.

Non richiede manutenzione particolare e non interferisce con le Sue attività giornaliere. E' possibile che nelle 24-48 ore dopo l'impianto compaia rossore e/o gonfiore sulla cute attorno all'area, eventualmente associato a dolore, comunque di modesta entità. Si tratta di fenomeni che tendono a regredire rapidamente. Se al contrario questi fenomeni persistono anche a distanza di tempo dall'impianto è necessario che si rivolga al Suo medico oncologo o al personale infermieristico. E' importante evitare sforzi nel corso della prima settimana dal posizionamento per evitare uno spostamento del Porth sotto la cute. Dopo circa 10 giorni potrà svolgere qualsiasi attività quotidiana. Quando il Porth non è in uso non è necessario nessun bendaggio. Se , invece viene attuata un'infusione continua di farmaci , il bendaggio si rende necessario in modo da garantire la protezione e la corretta posizione dell'ago inserito nel setto.

MANUTENZIONE

La manutenzione richiede dei periodi di lavaggi (ogni tre , quattro settimane) eseguiti dal personale infermieristico, anche quando il sistema non è in uso. Le verrà consegnato dall'infermiera un cartellino tascabile dove verrà riportata la data di impianto e i successivi lavaggi mensili. Tali lavaggi richiedono soluzioni adatte ad evitare l'ostruzione del catetere . Per poter valutare la regolarità del flusso ed il corretto posizionamento dell'ago , i lavaggi verranno effettuati anche prima del normale uso previa aspirazione, così come dopo ogni utilizzo del porth (prelievo ematico o terapia)

QUANDO RIMUOVERLO

Il porth può rimanere in sede per tutto il tempo che il medico lo ritenga necessario (mesi, anni). Nel momento che l'utilizzo del catetere venoso centrale non sia più necessario, il porth verrà rimosso. Tale rimozione richiede un piccolo intervento simile a quello per l'impianto.