

Paziente con FA non valvolare*

E' necessario che sia soddisfatta **almeno una** delle seguenti possibilità:

CHA₂DS₂-Vasc ≥ 1 e HAS-BLED > 3 (Paziente a rischio elevato)

oppure

TTR $< 60\%$ (INR instabile negli ultimi 6 mesi)

oppure

il paziente ha difficoltà oggettive ad eseguire controlli INR (ad esempio il paziente che ha l'infermiera a domicilio)

* FANV Nuova Insorgenza, Parossistica, Persistente e Permanente

C	Scopenso/ Disfunzione Ventricolare Sinistra	1	H	Iperensione	1
H	Iperensione	1	A	Dialisi/ Trapianto/ Creatinina $> 200 \mu\text{mol/L}$	1
A	Età > 75 anni	2	S	Pregresso Ictus Cerebrale	1
D	Diabete mellito	1	B	Storia di sanguinamento o diatesi emorragica o anemia	1
S	Pregresso Ictus/ TIA/ episodio tromboembolico	2	L	Labile controllo INR ($< 60\%$)	1
V	Precedente IM/ Malattia Arteriosa periferica/ placca aortica	1	E	Età > 65 anni	1
A	Età 65-74 anni	1	D	Terapia concomitante con antiaggreganti/FANS	1
S	Sesso femminile	1		Etilismo cronico (Alcohol intake)	1
-	Totale CHA₂DS₂-VASc		-	Totale HAS-BLED	

Paziente con TVP/EP

- Trattamento della Trombosi Venosa Profonda (TVP)
- Trattamento della Embolia Polmonare (EP)
- Prevenzione delle recidive di TVP
- Prevenzione delle recidive di EP

E' necessario che sia soddisfatta **almeno una** delle seguenti possibilità:

Sono Eleggibili pazienti:

con diagnosi recente (48 ore) di TVP

oppure

in terapia con ENF, EMBP, fondaparinux

Clearance Creatinina (Cockcroft-Gault)

mL/min